


# NPP Hojná Voda

Jihočeský kraj


Průběžná zpráva za rok 2009 a 2010



Zdroj: [www.fotoaparar.cz](http://www.fotoaparar.cz)

Území bylo v roce 2009 monitorováno metodou volně zavěšených pastí v prsní výšce. Využito bylo 8 pastí. V sezoně 2010 byly pasti vyměněny za kmenové. Pasti byly umístěny po celém území. Pasti byly aktivovány v květnu a deaktivovány na konci léta, poté byly odstraněny.

Dále bylo v území v roce 2010 sledováno pro výskyt saproxylických hub, konkrétně na 8 zkusných kruhových plochách. Celkem byly provedeny čtyři návštěvy v období od jara do podzimu.



**Obrázek 1. Lokalizace NPP Hojná Voda (www.mapy.cz).**

Zatím bylo ze sezony 2009 determinováno 60 druhů (276 jedinců) brouků, přičemž 65% druhů byly saproxylictí brouci. Vzhledem k nedokončené determinaci nebyla prozatím provedena analýza druhů z červeného seznamu. Žádný determinovaný druh patří mezi zákonem chráněné.

**Ze zjištěných výsledků nelze vyvozovat vážnější závěry. Je patrné, že se díky velkému množství bukového mrtvého dřeva namnožilo mnoho floeoxylofágů vázaných na tuto dřevinu. Jejich vliv na zdraví porostů je však minimální až zanedbatelný.**